



ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ: Melanotan-2 nasal spray

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА: прозрачная жидкость

ФОРМУЛА: C50H69N15O9

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ВЕС: 1024.2

ВЕС НЕТТО: 20 mg (20000 meg)

ЧИСТОТА ПЕПТИДА: >98%

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФОРМУЛА: Ac-Nle-Asp-His-D-Phe-Arg-Trp-Lys-NH₂-(cyclic 2-7)

Меланотан 2 (MT2) - инновационный способ стимуляции загара и предотвращения вредных последствий УФ-излучений. MT2 - это синтетический пептид, аналог натурального гормона Меланокортина, который является основным фактором, стимулирующим клетки кожи к производству меланина, пигмента, окрашивающего кожу и защищающего кожу от вредных УФ-лучей.

Показания к применению

Препарат применяется в случаях, когда нарушена функция выработки пигмента (меланина), путем стимуляции гипофиза на выработку данного пигмента, а также для защиты от УФ-излучения путем появления видимого загара

Противопоказания

Препарат противопоказан беременным и кормящим, а также женщинам в период лактации.

Лицам, не достигшим 18 лет.

Противопоказан людям с какими-либо видами опухолей.

Противопоказан людям с признаками меланомы и гиперпигментации.

Как применять и дозировка

Препарат используется назально при помощи дозатора, ежедневно, несколько раз в сутки, в зависимости от вашего веса, в любое удобное время.

Дозировки указаны в разделе ДОЗИРОВКА. 1 использование считается по 1 впрыску в каждую ноздрю.

Курс применения препарата составляет 10-15 дней.

Период между впрысками спрея должен быть не менее 2 часов.

При слабом эффекте можно увеличить дозировки на 30%, а курс продлить до достижения нужного результата, но не более 30 дней ежедневного использования.

В течение курса необходимо обязательно посещать солярий, либо загорать на солнце не менее 3-4 раз. Первый поход в солярий осуществить после 3-4 дней использования препарата.

Спрей можно использовать за 40 минут -1 час до похода в солярий. Это усилит эффект от использования. Загорать необходимо с промежутком в 3-4 дня, 4-8 минут в солярии будет вполне достаточно. При достижении желаемого загара, препарат используется 1-2 дня в неделю (по желанию), по полному дню для поддержания загара.




Шаг 1

Снимите защитный колпачек.



Шаг 2

Проверьте пульверизатор. Нажмите на белый аппликатор и удерживайте до получения струи.



Шаг 3

Немного наклоните голову вперед. Вставьте аппликатор в ноздрю и сделайте впрыск. Прodelайте то же самое для второй ноздри.



Шаг 4

Наклоните голову назад и сделайте обычный вдох.

Дозировка

Разовая дозировка спрея рассчитывается в зависимости от вашего веса и указана ниже в таблице.

ВЕС	КОЛИЧЕСТВО ВПРЫСКИВАНИЙ В ДЕНЬ	ИТОГО ВПРЫСКИВАНИЙ В СУТКИ
50 кг	3 раза в сутки, в обе ноздри	6 впрыскиваний в сутки
75 кг	4 раза в сутки, в обе ноздри	8 впрыскиваний в сутки
100 кг	5 раза в сутки, в обе ноздри	10 впрыскиваний в сутки

Рекомендуется придерживаться данных дозировок, так как они считаются наиболее оптимальными и безопасными. Большие дозировки позволят быстро загореть, но также могут привести к появлению веснушек и гиперпигментации.

Необходимо относиться к этому серьезно, а также внимательно следить за состоянием кожного покрова. При первых признаках появления веснушек рекомендуется снизить дозировку на 30%.

Особые указания

Рекомендуется увлажнять кожу при использовании спрея Меланотан-2 для предотвращения появления «меланотановых веснушек».

Взаимодействие с лекарственными препаратами

Не рекомендуется использовать совместно с сильнодействующими антибиотиками.

Побочные эффекты

Повышение артериального давления

Как правило, проявляется в течении 1-3й инъекции, далее организм привыкает к препарату и этот побочный эффект пропадает

Тошнота и неприятные ощущения в области живота

Возможно появление легкой тошноты и неприятных ощущений в области живота. Это связано с тем, что препарат способен влиять на пищеварительный тракт. При данном побочном эффекте рекомендуется снизить дозировку и делать инъекции на ночь перед сном.

Появление веснушек

Возможно появление веснушек в местах скопления меланина. Для того, чтобы предотвратить этот эффект рекомендуется увлажнять кожу и снизить частоту использования препарата на 50 %. Появление веснушек-это временное и обратимое явление, как правило они пропадают через 3-6 недель после отказа от препарата.

Повышение либидо

Как правило, повышение либидо в основном наблюдается у мужчин и проявляется в виде спонтанной эрекции. Вероятность повышения либидо у женщин составляет 20% и, как правило, проявляется при повышенных дозировках.

Покраснение кожи

Это вызвано повышением артериального давления и как правило проходит через 30 минут после применения.

Похудение

При использовании спрея Меланотан 2 есть вероятность того, что вы сможете похудеть, так как он ускоряет липолиз (расщепление) жирных кислот, но при условии физических нагрузок.

Условия хранения

Спрей Меланотан 2 необходимо хранить в холодильнике, при температуре от 2 до 8 °С. Допускается хранения (транспортировка) спрея при комнатной температуре в течении не более 30 дней без потери качества товара.

При длительном хранении спрея вне холодильника, более 30 дней, его свойства теряются.

Эффективность вскрытого спрея начинает уменьшаться, после 3-4 месяцев от начала использования.

Срок годности до начала использования, указан на этикетке.

Спрей не нужно трясти, ронять, взбалтывать!

Перед применением препарата рекомендуется проконсультироваться с врачом.